生後６か月～４歳
のお子様の保護者の方へ

新型コロナワクチン接種のお知らせ

≪乳幼児用コロナワクチンを３回接種した方へ送付しています≫

作成：長崎市（R5.12.25 時点の情報）

前回のコロナワクチン接種から３か月を越える日以降に接種ができます。
使用するワクチンは、乳幼児用オミクロン株（XBB.1.5）対応１価ワクチンです。
接種のご案内をお送りしていますが、**接種は強制ではなく、あくまでも任意です。**

接種を希望の方

医療機関へ電話予約

医療機関の確認方法

①長崎市ホームページ（医療機関一覧）
②長崎市ワクチン接種コールセンター

乳幼児用オミクロン株（XBB.1.5）対応１価ワクチンを取り扱っている医療機関を予約してください。

接種当日

《持参》
接種済証、本人確認書類（保険証など）母子健康手帳
お薬手帳、予診票

《予診票》事前に記入を

《服装》
接種しやすいもの
※標準的な接種部位は【1歳未満】太もも　【1歳以上】上腕部
接種後に経過観察のため、15～30分程度待機していただきます。お子様が緊張しないよう、普段遊ぶおもちゃや絵本などもお持ちください。

◎生後６か月～4歳のワクチン接種は、乳幼児用オミクロン株（XBB.1.5）対応１価ワクチンを使用します。５歳～11歳及び12歳以上用のワクチンは接種できません。
◎お電話でご予約の際は、生後６か月～４歳の**4回目**接種であることをお伝えください。
◎かかりつけ医がある方は、事前にかかりつけ医に相談してください。
◎お住まいの市町村以外でも接種できる場合があります。詳しくは市ワクチン接種コールセンターへお尋ねください。

長崎市ホームページ

接種券や接種時期、接種できる医療機関，ワクチンの種類など、ご不明な点がある場合は

長崎市ワクチン接種コールセンター☎0120-095827（無料）

8：45～17：45（土日祝含む）

※お問い合わせが集中し、電話がかかりにくい時があります。

ワクチン接種については任意です。パンフレットや市のホームページをご覧いただき、ご検討ください。

お子様と保護者のかたへ

接種の際には、以下のことをご確認し、そのうえで接種するかどうかをご検討ください。また、かかりつけ医がいる場合は、事前にご相談ください。なお、お住いの市町村以外でも接種できる場合があります。

接種の際は、
母子健康手帳を
お持ちください。

使用するワクチン

生後６か月～４歳の方は、４回目の接種において、乳幼児用オミクロン株（XBB.1.5）対応１価ワクチンを使用します。小児（5～11 歳）用ワクチン及び12 歳以上用のワクチンは接種できませんのでご注意ください。なお、前後に他の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13 日以上の間隔をあけてください。（※ただし、インフルエンザワクチンは同時接種が可能です。）

ワクチン接種は強制ではありません。「発症予防効果などのメリット」と「副反応などのデメリット」の両方について、正しい知識を持っていただいたうえで、お子様のワクチン接種をご検討ください。

メリット	•米国をはじめとした海外の複数の国々で生後6 か月～1 歳及び2 ～4 歳を対象に実施された臨床試験の結果によると、3 回目の接種から1 か月後の血清中の新型コロナウイルスに対する中和抗体価（ウイルスの感染力または毒素の活性を中和できる抗体の数値）が上昇し、有効性が期待できるとされています。 出典　厚生労働省ホームページより
デメリット	• 接種部位の痛みや疲労、発熱、頭痛等、様々な症状が確認されていますが、ほとんどが軽度または中等度であり回復していること、現時点で得られている情報からは、安全性に重大な懸念は認められていないと判断されています。

症状が出た人の割合	症状
	６か月～4 歳
50%以上	機嫌が悪い
５～50%	注射部位の痛み、注射部位の発赤や腫れ、頭痛、食欲減退、下痢、嘔吐、筋肉痛、疲労、発熱、悪寒
１～5%	関節痛

出典　厚生労働省ホームページより

＜　接種後の副反応に関する専門的な相談・乳幼児へのワクチン接種に関して疑問や不安がある場合の相談は　＞

長崎県コロナワクチンコールセンター　☎0120-764-060（無料）（※24 時間対応（土日祝日含む））

※この情報は令和５年12 月25 日時点の情報です。最新の情報は市ホームページまたは市ワクチン接種コールセンターでご確認ください。

ワクチン接種の有無等による差別は絶対にしないでください。